


Hernie inguinale chez les nourrissons et les jeunes enfants

Les temps d'attente plus longs pour la réduction chirurgicale d'une hernie inguinale chez les nourrissons et les jeunes enfants causent plus de visites à l'urgence et accroissent le risque de hernie irréductible.

Zamakhshary et ses collaborateurs, qui se sont fondés sur des données tirées de bases de données administratives couplées, ont constaté que le fait d'attendre une intervention chirurgicale plus de 14 jours doublait le risque de hernie irréductible. **Voir Recherche, page 1001**

On a en grande partie oublié les enfants

dans le débat sur les temps d'attente en chirurgie, affirme Blair. **Voir Commentaire, page 983**



Photos.com

La néphropathie chronique chez les Autochtones

Les Autochtones qui ont une néphropathie sévère étaient 43 % moins susceptibles que les non-Autochtones de consulter un néphrologue. Les Autochtones étaient presque deux fois plus susceptibles aussi d'être hospitalisés pour un trouble qu'il est possible de gérer efficacement en soins ambulatoires. **Voir Recherche, page 1007**

Peiris et ses collaborateurs affirment que nous devons comprendre les causes sous-jacentes des disparités au niveau de l'accès aux soins de santé entre les Autochtones et instaurer des changements basés sur la collaboration. Des forces institutionnelles, politiques, structurelles, sociales et culturelles résistent souvent à un tel changement. **Voir Commentaire, page 985**

La médiocrité de l'échange d'information en soins de santé

Dans le cadre d'une étude de cohorte prospective multicentrique portant sur des patients qui ont reçu leur congé de l'hôpital, van Walraven et ses collaborateurs signalent que

l'information découlant d'une consultation antérieure d'un autre médecin était disponible 22 % du temps pendant la consultation en cours. **Voir Recherche, page 1013**

Les façons traditionnelles de transférer de l'information entre professionnels ne suffisent pas pour assurer la continuité des soins de santé, affirment Reid et Wagner. **Voir Commentaire, page 987**

Poursuite fondée sur la naissance préjudiciable

Selon le guide de pratique clinique de 2007, il faut offrir à toutes les femmes enceintes le dépistage prénatal. Piro et ses collaborateurs préviennent que l'on pourrait donner droit à davantage de poursuites si les cliniciens ne pratiquent pas conformément à la nouvelle norme de soins. **Voir Analyse, page 1027**

Céphalée en coup de tonnerre postnatale

Une femme de 31 ans s'est présentée avec une céphalée en coup de tonnerre grave et des crises d'épilepsie deux jours après avoir accouché. **Voir Dans la Pratique, page 1033**

Pneumopéricarde

Un homme de 21 ans qui avait une tumeur au médiastin et qui était en détresse respiratoire a été victime d'un pneumopéricarde. **Voir Images cliniques, page 1087**



Hôpitaux en partenariat public-privé

Le débat sur les avantages des hôpitaux en partenariat public-privé est très polarisé au Canada. Les points litigieux sont le coût, la flexibilité, la transparence et l'intérêt du public. **Voir Actualités, page 991**



Rachelle Labrecque / Sault Star