CMAJ - Canadian Medical Association Journal

Results from the CMA's 2003 Physician Resource Questionnaire

Practice Setting

	Overall	Female	Male	< 35	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65+	GP/FP	Med Spec	Surg Spec	Rural	Urban
Number of respondents	2251	765	1486	213	617	739	457	225	1236	739	276	203	2048
Non-clinical	2.4%	1.4%	3.0%	0.5%	1.0%	2.7%	3.7%	4.9%	2.8%	2.3%	1.4%	0.5%	2.6%
Solo clinical	21.5%	13.5%	25.6%	7.0%	11.8%	22.3%	31.7%	38.2%	18.4%	20.2%	39.1%	21.7%	21.5%
Hospital-based clinical	20.2%	19.7%	20.5%	32.4%	25.6%	18.4%	14.0%	12.4%	11.5%	38.2%	11.2%	18.7%	20.4%
Group clinical	41.7%	46.3%	39.3%	34.3%	47.3%	44.0%	37.9%	33.3%	50.6%	27.2%	40.6%	48.8%	41.0%
Locum only	2.3%	5.2%	0.7%	11.7%	1.9%	1.1%	1.1%	0.4%	3.7%	0.3%	1.1%	2.0%	2.3%
Other clinical	2.2%	3.1%	1.7%	2.8%	1.8%	3.0%	1.1%	2.7%	2.0%	3.0%	1.1%	0.5%	2.4%
Combination of non-clinical & clinical	1.2%	0.9%	1.4%	1.4%	1.3%	1.6%	0.9%	0.4%	1.6%	0.7%	1.1%	1.5%	1.2%
Combination of 2 or more clinical settings	5.9%	6.9%	5.4%	9.4%	6.6%	4.6%	6.1%	4.4%	7.1%	5.3%	2.2%	5.9%	5.9%
No response	2.5%	2.9%	2.4%	0.5%	2.6%	2.3%	3.5%	3.1%	2.3%	3.0%	2.2%	0.5%	2.7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%